

TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

CARLOS EDUARDO DA LUZ MOREIRA

Esta seção tem por finalidade realizar uma auto-avaliação dentro das áreas de conhecimento da Colo-Proctologia.

As perguntas elaboradas são originais e com respostas comentadas e acompanhadas de referências bibliográficas.

O coordenador da seção se coloca à disposição daqueles sócios que aqui desejam participar.

Questões

1. A cirurgia de escolha para o tratamento da fístula colovesical por Doença Diverticular do sigmóide é a sigmoidectomia com:
 - A) Anastomose primária e transversostomia de proteção.
 - B) Anastomose primária e cistectomia parcial.
 - C) Fechamento do coto retal e colostomia terminal.
 - D) Anastomose primária sem cistectomia parcial.
 - E) Anastomose primária e cistostomia.
2. Em relação à Hemorragia Digestiva Baixa, uma das alternativas abaixo está correta:
 - A) O mapeamento por radioisótopos informa melhor a natureza da lesão do que a arteriografia.
 - B) Nos pacientes com sangramento profuso a arteriografia informará o local do sangramento em qualquer momento de sua realização.
 - C) A natureza intermitente do sangramento representa uma desvantagem da arteriografia.
 - D) Não se deve fazer preparo de colo para a realização da colonoscopia.
 - E) A injeção endovenosa de Tecnésio 99 é mais eficaz que a injeção endovenosa de hemácias autólogas marcadas com Tecnésio 99 na localização de sangramentos de baixo fluxo (menor que 0,1 ml/min).
3. Qual grupo de pacientes abaixo relacionados não tem contra-indicação para ser submetido à cirurgia de bolsa íleo-anal no tratamento da Retocolite Ulcerativa Inespecífica?
 - A) Idosos (acima de 65 anos).
 - B) Previamente operados de fístula anal.
 - C) Portadores de doença perianal importante.
 - D) Que apresentam displasia acentuada.
 - E) Obesos.
4. Quando comparamos uma anastomose mecânica com uma anastomose manual, qual das alternativas abaixo não está correta?
 - A) A anastomose manual apresenta um diâmetro maior que a mecânica no vigésimo oitavo dia de pós-operatório.
 - B) A quantidade de colágeno no sétimo dia de pós-operatório é maior na anastomose manual.
 - C) No vigésimo oitavo dia de pós-operatório encontramos ao exame histológico maior epitelização e menor grau de inflamação na anastomose manual.
 - D) Não há diferença no suprimento sanguíneo na linha de sutura quando comparamos as duas anastomoses.
 - E) No vigésimo oitavo dia de pós-operatório encontramos ao exame histológico menor grau de epitelização e maior grau de inflamação na anastomose mecânica.

(Ver respostas na pág. 220.)

43º CONGRESSO BRASILEIRO DE COLO-PROCTOLOGIA

COMUNICADO

Inscrições do Congresso: pagamento através da conta nº 580-3 - BANCO DO BRASIL/Agência nº 06971
Recife - PE - 43º Congresso Brasileiro de Colo-Proctologia

ENVIAR XEROX DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO PARA A
SECRETARIA DO CONGRESSO: PROMOVE
Av. Lins Petil, 159 - Bl. B/ Sala 02 - Boa Vista
Recife - PE - CEP 50070-230
Telefax: (081) 421-1181

ATENÇÃO: Só será considerada a inscrição mediante o *comprovante de pagamento*.
Agência de viagem: BBTUR (passagens e hospedagens) - Fone: (081) 424-2122, Ramal 369 - Fax: (081) 224-3774