

RESPOSTAS DO TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

1 - A resposta certa é a letra B

A ressecção do mesorreto é importante na diminuição da recidiva local nos pacientes portadores de Câncer do Reto. Nos tumores do 1/3 superior devemos ressecar o mesorreto com uma margem distal de 5 cm, enquanto que nos tumores do 1/3 médio e inferior todo o mesorreto deve ser removido.

Wexner SD, Vernava AM. Clinical Decision Making in a Colorectal Surgery. IGAKU-SHOIN Medical Publishers, Inc. 1995: 245-248.

2 - A resposta certa é a letra E.

As perfurações reconhecidas durante a colonoscopia, geralmente são perfurações maiores devido a barotrauma ou injúria mecânica, não sendo passíveis de tratamento clínico expectante associado a antibioticoterapia. O tratamento cirúrgico deverá ser o debridamento e sutura da perfuração, desde que não exista patologia colônica associada e que o preparo intestinal esteja adequado.

Wexner SD, Vernava AM. Clinical Decision Making in a Colorectal Surgery. IGAKU-SHOIN Medical Publishers, Inc. 1995: 477-480.

3 - A resposta certa é a letra D.

A técnica de Politano-Leadbetter é usada para reimplante do ureter na bexiga, com mecanismo anti-refluxo, através da realização de um túnel submucoso na parede vesical. Nos casos de injúria do ureter distal, não devemos fazer uma ureteroureterostomia, sendo preferível o reimplante por esta técnica.

Ferrari BT, Ray JE, Gathright JB. Complication of Colon and Rectal Surgery - Prevention and Management. W.B. Saunders 1985: 15.

4 - A resposta certa é a letra B.

A disenteria bacilar é uma enterocolite causada pela *Shigella* sp. Aparece de forma aguda, acompanhada de febre, diarreia e desidratação. O paciente apresenta um quadro clínico de dor abdominal, tenesmo, perda de muco e sangramento retal. Na retossigmoidoscopia podemos encontrar uma proctite com edema, friabilidade e ulcerações. O diagnóstico laboratorial é feito por cultura: a) material obtido por swab das ulcerações; b) fezes; c) muco. O tratamento consiste em medidas de suporte, pois a doença é autolimitada. Nos casos que necessitam antibioticoterapia a ampicilina é a droga de escolha, ou como 2ª opção a sulfametoxazol + trimetoprima.

Corman ML. Colon and Rectal Surgery. 3rd. J.B. Lippincott Company 1984: 743.