

**III CONGRESSO LATINOAMERICANO DE  
CIRURGIA ENDOSCÓPICA**

16 a 19 de setembro de 1998  
ALACE- Rua Pelotas, 562  
CEP 04012-002 - São Paulo - Brasil  
Tel: (011) 572-9835 - Fax: (011) 549-8780

**COLORECTAL DISEASES IN 1998 -  
AN INTERNATIONAL EXCHANGE OF MEDICAL AND  
SURGICAL CONCEPTS**

FEBRUARY 19-21, 1988  
Cleveland Clinic Florida Educational Department  
2950 W CyPress Creeek RD - FT - Lauderdale, FL 33309  
1(800)359-5101 - (954)978-5056 - Fax: (954)978-5539

## RESPOSTAS DO TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

---

### 1. A resposta certa é a letra D

A lesão primária sífilítica mais comum localiza-se no canal anal ou margem anal. Ocasionalmente o cancro primário ocorre na porção mais inferior do reto, causando uma úlcera localizada com proctite circundante.

Goligher JC. Cirurgia do Ânus, Reto, e Colo. 5ª ed. Editora Manole 1990; 1124-1125.

### 2. A resposta certa é a letra E

A via cirúrgica de York-Mason se faz através de um acesso transesfincteriano, onde toda a musculatura dos elevadores, esfíncter externo e esfíncter interno é seccionada por uma incisão na linha mediana posterior. Permite uma ótima abordagem ao terço inferior e médio do reto, sendo usada principalmente para as lesões localizadas na parede anterior.

Corman ML. Colon and Rectal Surgery, 3rd. J B Lippincott Company 1984; 396-397.

### 3. A resposta certa é a letra A

A pneumatose coli é uma doença pouco freqüente, de origem desconhecida, que acomete principalmente os pacientes idosos, podendo também ser vista em qualquer idade. A enfermidade associada mais comum é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Uma das possibilidades para o aparecimento desta associação seria a ruptura de bolhas pulmonares com dissecação do retroperitônio, possibilitando a chegada de gás na parede intestinal ao longo dos vasos sangüíneos

Cornan ML. Colon and Rectal Surgery 3rd. J.B., Lippincott Company 1984; 716-718.

### 4. A resposta certa é a letra C

O tratamento inicial da colite pseudomembranosa consiste na suspensão do antibiótico responsável e reposição hidroeletrólítica adequada. Os medicamentos que diminuem a peristalse devem ser evitados. O metronidazol é a 2ª opção terapêutica nestes casos.

Wexner SD, Vernava AM. Clinical Decision Making in Colorrectal Surgery. Medical 1995; 29.