

RESPOSTAS DO TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

1. A resposta certa é a letra D

Os sangramentos oriundos do intestino delgado ocorrem em 3 a 5% dos casos de hemorragia digestiva baixa. A angiodisplasia é a causa mais freqüente, aparecendo em 70 a 80% destes casos.

Vernava AM, Moore BA, Longo WE, Johnson FE. Lower Gastrointestinal Bleeding. *Dis Colon Rectum* 1997; 40: 846-55.

2. A resposta certa é a letra C

Os autores fizeram um estudo prospectivo em 180 pacientes do Departamento de Cirurgia Colorretal do Hospital Geral de Singapura e encontraram divertículos somente no colo direito em 42%, no colo esquerdo em 34% e em todo o colo em 24% dos casos. Recentes trabalhos mostram um aumento gradual da Doença Diverticular em populações asiáticas, com predominância de localização no colo direito.

Wong SK, Ho YH, Leong AP, Choen FS. Clinical Behavior of Complicated Right-sided and Left-sided Diverticulosis. *Dis Colon Rectum* 1997; 40: 344-7.

3. A resposta certa é a letra E

Os pacientes que apresentam diverticulite com abscesso pericólico (Estágio I) ou pélvico (Estágio II) podem ser submetidos a cirurgia em um único estágio, estando a mesma contra-indicada nos pacientes com peritonite purulenta difusa (Estágio III) e peritonite fecal (Estágio IV), em que a melhor opção seria a operação de Hartmann.

Lee EC, Murray JJ, Collier JA, Roberts PL, Schoetz DJ. *Dis Colon Rectum* 1997; 40: 669-674.

4. A resposta certa é a letra A

Este procedimento foi descrito por Howard Frykman na Universidade de Minnesota em 1955, pois acreditava que por esta técnica todas as anormalidades anatômicas que contribuem ou que estão associadas a Procidência do reto seriam corrigidas. Atualmente a maioria dos cirurgiões deixou de reparar o assoalho pélvico, a não ser que exista um defeito significativo.

Jacobs LK, Lin YJ, Orkin BA. A melhor Operação para o Prolapso Retal. *Novidades e Controvérsias no Tratamento das Doenças Colorretais. Clínicas Cirúrgicas da América do Norte* 1997; 1: 49-69.