

16º CONGRESSO ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE COLOPROCTOLOGIA (ALACP)

28-31 de outubro de 1999

Santiago - Chile
Roman Diaz 205 of. 401
Providencia P.O. Box 2843
Fono: (56-2) 236-2831
Fax: 56-2) 235-1741
Santiago - Chile

INTERNATIONAL SOCIETY OF UNIVERSITY COLON AND RECTUM SURGEONS

XVIII BIENAL CONGRESS

23-27 julho 2000
Hotel Transamérica
São Paulo - Brasil
Phone: +55-19-252-5611
Fax: +55-19-254-3839

RESPOSTAS DO TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

1 - A resposta certa é a letra B

O trânsito colônico está prolongado especialmente no colo esquerdo e reto nos pacientes que sofreram lesões raquimedulares. A constipação intestinal e a dificuldade de defecação são os problemas mais comuns nestes pacientes, ocorrendo em mais de 80% dos casos.

Krogh K, Nielsen J, Djurhuus JC, Mosdal C, Sabroes S, Laurberg S. Colorectal Function in Patients with Spinal Cord Lesions. *Dis Colon Rectum* 1997; 40: 1233-39.

2 - A resposta certa é a letra D

O risco de desenvolvimento de uma infecção anorretal em pacientes leucêmicos está relacionado com a gravidade e duração da neutropenia. Vanheuverzwyn e col. observaram que a infecção ocorria em 11% dos pacientes com contagens de neutrófilos inferiores a 500/mm³, em oposição a 0,4% nos pacientes cuja contagem era superior a este número. Glenn e col. relataram que 63% de todos os processos infecciosos anorretais ocorriam em pacientes com o número de neutrófilos inferior a 500.

Gilliland R, Wexner SD. Sepsis Anorretal Complicada - Novidades e Controvérsias no Tratamento das Doenças Colorettais. *Clínicas Cirúrgicas da América do Norte* 1997; 1: 120-123.

3 - A resposta certa é a letra B

Os sintomas mais frequentes de uma enterite actínica são diarreia e náuseas, que na maioria dos casos, são tratados com antidiarréicos e antieméticos, com bons resultados. Uma dieta pobre em gordura e lactose também são de grande valia.

Wexner SD, Vernava AM. *Clinical Decision Making in Colorectal Surgery*. Igaku-Shoin Medical Publishers, Inc. 1995: 409-412.

4 - A resposta certa é a letra A

Em trabalho realizado no Serviço de Colo-Proctologia do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, os autores estudaram 1.450 pacientes HIV positivos. Foram encontrados 362 doentes (24,9%) com ulcerações na região anal. As biópsias realizadas mostraram uma maior incidência de herpes simples (64%). As lesões por citomegalovírus ocorreram em 8% e as por monília em 3%. É importante ressaltar que em 17% dos casos não foi possível determinar a patologia destas ulcerações.

Nadal SR, Manzione CR, Galvão SM, Salim VRBM, Speranzini MB. Manifestações Perianais nos Doentes Infectados pelo HIV - Comparação com uma população soronegativa. *Rev bras Colo-Proct* 1997; 17(1): 15-19.