

### 1. A biópsia retal na amiloidose:

- a) Deve ser feita na parede anterior, colhendo fragmentos mucosos superficiais, para evitar perfuração.
- b) Não deve ser feita nas válvulas de Houston.
- c) Tem valor tanto no diagnóstico como na avaliação da resposta terapêutica.
- d) Dá menos resultados positivos que a biópsia de pele.
- e) Corar o material com hematoxilina-eosina é o meio mais fácil de estabelecer o diagnóstico.

### 2. O “avanço mucoso” para tratamento das fístulas anais:

- a) É boa técnica para as fístulas anais complexas, mas inadequada para as fístulas reto-vaginais.
- b) A mucosa a ser avançada deve ser bem liberada do esfíncter subjacente e dissecada até 2,5cm acima do orifício interno da fístula.
- c) As fístulas posteriores são mais aptas ao método porque a mucosa aí é mais fácil de liberar.
- d) O retalho a ser deslizado deve ser espesso, ou seja, conter parte do esfíncter interno, além da mucosa.
- e) Por não seccionar a musculatura esfíncteriana, deve ser indicado para todas as fístulas anais.

### 3. Em relação à radioterapia pré-operatória como co-adjuvante no tratamento dos tumores retais:

- a) Leva a maior dano do intestino delgado, já que na radioterapia pós-operatória o cirurgião pode afastar o delgado da pelve.
- b) As células do tecido fibrótico pós-operatório respondem melhor, favorecendo o tratamento radioterápico posterior à cirurgia.
- c) A longa demora que acarreta ao tratamento cirúrgico facilita disseminação do tumor.
- d) Não atua na diminuição do volume tumoral.
- e) Uma de suas desvantagens é a possibilidade de irradiar pacientes demais, devidos às dificuldades de estadiamento preciso antes da cirurgia.

### 4. A polipose adenomatosa familiar (FAP):

- a) É uma doença autossômica dominante que se manifesta em adolescentes e adultos jovens.
- b) É uma doença de transmissão pelo cromossoma X assim como a hemofilia e o daltonismo.
- c) Embora apresente o colon forrado de pólipos tem um índice de transformação maligna muito pequeno.
- d) É uma doença que geralmente se manifesta na infância, com um quadro de obstrução intestinal.
- e) A manifestação na idade adulta é o sangramento, que ocorre em torno da sexta década e se confunde com a doença diverticular.