

TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

JOSÉ RICARDO HILDEBRANDT COUTINHO - TSBCP

COUTINHO JRH. Teste de Auto-Avaliação. *Rev bras Coloproct*, 2004; 24(2):186

1- Paciente com quadro de diverticulite aguda no estágio IIA de Hinchey, clinicamente estável, imunologicamente não comprometido, deve ser tratado preferentemente por:

- A- Ressecção colônica com anastomose primária.
- B- Ressecção colônica com tratamento à Hartmann.
- C- Ileostomia.
- D- Laparotomia, drenagem e colostomia transversa.
- E- Drenagem por TC e antibioticoterapia.

2- Paciente com quadro abdominal agudo de peritonite purulenta por diverticulite aguda deve ser classificado no estadiamento de Hinchey como:

- A- I.
- B- IIA.
- C- IIB.
- D- III.
- E- IV.

3- Constitui contra-indicação absoluta para a realização de colonoscopia:

- A- Gravidez.
- B- Suboclusão intestinal.
- C- Coagulopatias.
- D- Megacolon tóxico.
- E- Aneurisma não roto de aorta abdominal.

4- A manifestação extra-intestinal mais frequentemente associada à retocolite ulcerativa inespecífica é:

- A- Artropatia aguda.
- B- Episclerite.
- C- Eritema nodoso.
- D- Pioderma gangrenoso.
- E- Colangite esclerosante.