

TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

JOSÉ RICARDO HILDEBRANDT COUTINHO - TSBCP

COUTINHO JRH. Teste de Auto-Avaliação. *Rev bras Coloproct*, 2004; 24(3):287

1- Em relação ao antígeno carcinoembrionário podemos afirmar que:

- A- É um bom indicador diagnóstico para o câncer colorretal.
- B- Níveis altos no pré-operatório indicam bom prognóstico.
- C- É um indicador bastante preciso de recidiva tumoral.
- D- Pode ser um indicador de mau prognóstico.
- E- Sugerir uma possível recidiva é a sua única indicação.

2- O infliximab atua:

- A- Na doença de Crohn neutralizando o fator de necrose tumoral.
- B- Na retocolite ulcerativa inibindo a calcineurina.
- C- Na doença de Crohn promovendo antissepsia intestinal.
- D- Na doença inflamatória intestinal reduzindo os níveis de leucotrienos.
- E- Na doença inflamatória intestinal estimulando a síntese de prostaglandinas.

3- Paciente submetido a retossigmoidectomia abdominal por neoplasia retal obstrutiva. O exame histopatológico convencional diagnosticou leiomiossarcoma. Estudos de imagem pós-operatórios mostram metástase hepática tecnicamente irressecável. A melhor conduta a seguir é:

- A- Iniciar radioterapia.
- B- Iniciar quimioterapia com antraciclínicos ou fosfamida.
- C- Iniciar quimioterapia com mesilato de imatinib.
- D- Realizar estudo imunohistoquímico.
- E- Considerar o caso como fora de possibilidades terapêuticas.

4- A área mais frequentemente envolvida na endometriose intestinal é:

- A- Retossigmóide.
- B- Íleo terminal.
- C- Apêndice.
- D- Ceco.
- E- Colon descendente.