JOSÉ RICARDO HILDEBRANDT COUTINHO - TSBCP

COUTINHO JRH. Teste de Auto-Avaliação. Rev bras Coloproct, 2004; 24(4):398

- 1- A introdução da terapia antiretroviral altamente ativa (HAART) para pacientes com AIDS:
 - A- Diminuiu sensivelmente a incidência de neoplasias intraepiteliais anais pré-malignas.
 - B- Não teve influência na incidência do sarcoma de Kaposi do reto.
 - C- Não teve influência na incidência do linfoma não-Hodgkin do reto.
 - D- Melhorou a resposta de pacientes com câncer de canal anal à radioquimioterapia.
 - E- Diminuiu sensivelmente a freqüência da progressão de lesões anais pré-malignas para malignas.
- 2- Paciente no 4º dia após tratamento cirúrgico de aneurisma de aorta abdominal, apresenta diarréia, distensão abdominal, taquicardia persistente e acidose metabólica; necessita de grande volume de líquidos para estabilização. Qual dos exames abaixo tem maior importância propedêutica nesta situação?
 - A- Clister opaco
 - B- Tomografia computadorizada de abdome
 - C- Angioressonância dos grandes vasos abdominais
 - D- Arteriografia dos sistemas mesentéricos
 - E- Colonoscopia

- 3- A principal limitação para utilização do acesso videolaparoscópico na reconstrução do trânsito intestinal após cirurgia de Hartmann por diverticulite é:
 - A- Comprimento do coto retal
 - B- Comprimento do colon restante
 - C- Aderências firmes na pelve
 - D- Idade do paciente
 - E- Obesidade
- 4- A azatioprina, usada no tratamento das doenças inflamatórias intestinais, apresenta como principal efeito colateral:
 - A- Leucopenia
 - B- Formação de trombos nos membros inferiores
 - C- Gastrite
 - D- Hipertensão pulmonar.
 - E- Alopecia