

# TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

---

JOSÉ RICARDO HILDEBRANDT COUTINHO - TSBCP

---

COUTINHO JRH. Teste de Auto-Avaliação. *Rev bras Coloproct*, 2005; 25(2):199

---

## 1- A incidência de abscessos anais e celulite após hemorroidectomia convencional:

- A- É alta no método aberto devido à permanente exposição às bactérias intestinais.
- B- É alta no método fechado devido à deficiência de drenagem.
- C- Ocorre em aproximadamente 20% das hemorroidectomias, independentemente da técnica operatória.
- D- É quase desprezível na maioria das séries apresentadas.
- E- É bem superior à incidência após ligaduras elásticas e hemorroidectomia grampeada.

## 2- Fissuras, fístulas e abscessos anais são mais freqüentemente observadas na:

- A- Pancolite ulcerativa.
- B- Colite do lado esquerdo.
- C- Proctite ulcerativa.
- D- Doença de Crohn do delgado.
- E- Doença de Crohn do colon.

## 3- O tumor retrorretal mais comum no adulto é o:

- A- Cordoma.
- B- Hemangioma.
- C- Neurilemoma.
- D- Teratoma.
- E- Adenocarcinoma.

## 4- O método mais sensível para o diagnóstico de uma fístula retouretral é:

- A- Tomografia computadorizada com contraste retal.
- B- Retossigmoidoscopia.
- C- Cistoscopia.
- D- Cistografia.
- E- Clister opaco com duplo contraste.