

1- Paciente submetido a hemorroidectomia à Milligan Morgan. Exame histopatológico mostra carcinoma epidermóide invasivo. A melhor conduta a seguir é:

- A- Encaminhar o paciente imediatamente para radioquimioterapia.
- B- Encaminhar o paciente imediatamente para radioterapia isolada.
- C- Preparar o paciente imediatamente para amputação abdominoperineal do reto.
- D- Aguardar 4 a 6 semanas e proceder a múltiplas biópsias sob anestesia.
- E- Reexaminar o paciente após 6 meses.

2- A bactéria mais frequentemente encontrada em foliculites periclostômicas é:

- A- Staphylococcus aureus.
- B- Streptococcus beta hemolítico
- C- Clostridium difficile.
- D- Escherichia coli.
- E- Proteus mirabilis.

3- A respeito das úlceras estercorais podemos afirmar que:

- A- Ocorrem em mais de 10% dos pacientes com perfuração intestinal.
- B- Tipicamente ocorrem no bordo intestinal mesentérico.
- C- A melhor conduta na perfuração é sutura com derivação proximal.
- D- Está associada freqüentemente à impactação fecal.
- E- Apresenta-se sempre como uma ulceração única.

4- O conceito de carcinoma “de novo” se refere a:

- A- Tumor que se desenvolve da mucosa não polipóide.
- B- Reaparecimento de tumor após 5 anos de seguimento.
- C- Reaparecimento de tumor dentro de 5 anos de seguimento.
- D- Apresentação inicial do tumor de colon.
- E- Apresentação de tumor sem história familiar predisponente.