

TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

JOSÉ RICARDO HILDEBRANDT COUTINHO - TSBCP

COUTINHO JRH. Teste de Auto-Avaliação. *Rev bras Coloproct*, 2006; 26(2):219

1- Em relação à permanência de conduto nasogástrico em pós-operatório de ressecções colônicas podemos afirmar que:

- A- Resulta em diminuição da permanência hospitalar.
- B- Resulta em retorno mais precoce às funções gastrointestinais.
- C- Resulta em diminuição da chance de broncoaspiração.
- D- Devemos aguardar a eliminação de gases ou fezes para retirá-lo.
- E- Não deve ser colocado como um procedimento de rotina.

2- Paciente em investigação de constipação intestinal crônica foi submetido a estudo de trânsito colônico ingerindo uma cápsula com 24 anéis radiopacos. Radiografia de abdome realizada 5 dias após a ingestão mostrou apenas 2 anéis, localizados no reto. Isto significa que:

- A- Existe uma “obstrução de saída” de ordem anatômica ou funcional.
- B- Existe uma inércia colônica.
- C- O exame foi normal.
- D- O exame foi inconclusivo.
- E- Devemos aguardar até a eliminação de todos os anéis para interpretar o exame.

3- A melhor indicação do tegaserode na síndrome do intestino irritável é para pacientes com:

- A- Flatulência.
- B- Dor associada à diarreia.
- C- Dor associada à constipação intestinal.
- D- Doença intestinal inflamatória associada.
- E- Incontinência fecal associada.

4- No tratamento da hidrosadenite supurativa extensa das regiões perianal e glútea:

- A- Os melhores resultados são obtidos com o tratamento clínico com ácido retinóico.
- B- Os melhores resultados são obtidos com a fistulotomia e curetagem de cada trajeto.
- C- É obrigatória a realização de colostomia derivativa como complementação da cirurgia.
- D- A excisão cirúrgica radical com enxerto de pele é a melhor conduta.
- E- A radioterapia está indicada devido ao alto índice de neoplasias associadas.