

1 – A linfogranulomatose venérea (Doença de Nicolas Favre) é produzida por:

- A. Sorotipos A a C da *Chlamydia trachomatis*.
- B. Sorotipos D a K da *Chlamydia trachomatis*.
- C. Sorotipos L1, L2 e L3 da *Chlamydia trachomatis*.
- D. Subtipos 6 e 11 do Papillomavirus humano.
- E. Subtipos 16 e 18 do Papillomavirus humano.

2 – Na doença de Crohn ativa, a dose ideal de infliximabe para indução de remissão é:

- A. 1 mg / kg de peso.
- B. 5 mg / kg de peso.
- C. 10 mg / kg de peso.
- D. 25 mg / kg de peso.
- E. Uma dose inicial fixa de 750 mg.

3 – O meio mais preciso para determinar a distância da margem inferior de um tumor retal até a borda anal é:

- A. Ultrassonografia endorretal.
- B. Retossigmoidoscopia rígida.
- C. Colonoscopia.
- D. Tomografia computadorizada.
- E. Ressonância magnética.

4 – Quando comparamos o emprego da radioquimioterapia pré-operatória versus a pós-operatória no tratamento do câncer de reto, a principal desvantagem da terapia pré-operatória é:

- A. Diminuir a chance de preservação esfínteriana pela intensa fibrose decorrente da radioterapia pré.
- B. Perder a maior resposta que ocorre com a radioterapia pós-operatória, devido ao número menor de células tumorais.
- C. A eventual administração de um tratamento desnecessário a pacientes portadores de tumores iniciais.
- D. O aumento da toxicidade aguda que ocorre com a terapia pré-operatória.
- E. O aumento do número de implantes durante a cirurgia subsequente, conseqüente ao esfacelamento do tumor.