

**1 – Na operação de Duhamel para o tratamento do megacólon, a ressecção distal do intestino deve ocorrer a nível:**

- A. Da reflexão peritoneal.
- B. Do promontório.
- C. Do terço superior do reto.
- D. Do local de fusão das tênias.
- E. Logo acima do anel anorretal.

**2 – Os problemas proctológicos mais freqüentemente encontrados no puerpério (até 2 meses após o parto) são:**

- A. Proctite / trombose hemorroidária.
- B. Trombose hemorroidária / fissura anal.
- C. Fístula reto-vaginal / incontinência anal
- D. Fístula reto-vaginal / procidência retal.
- E. Abscesso anal / trombose hemorroidária.

**3 – A respeito da hemorroidectomia grampeada (PPH) podemos afirmar que:**

- A. É um método mais definitivo que a hemorroidectomia convencional.
- B. Necessita de um repouso mais prolongado devido ao risco de deiscência.
- C. Apresenta índices de incontinência fecal elevados após 6 meses da operação.
- D. O alto custo e a ocorrência de complicações graves têm limitado o seu uso.
- E. Cursa com mais dor do que o método convencional.

**4 – A manifestação mais comum na apresentação clínica dos linfomas do cólon é:**

- A. Dor abdominal.
- B. Hemorragia colônica.
- C. Perfuração.
- D. Obstrução intestinal.
- E. Volvo.

**Respostas na página 241**