

**1 - As perfurações que ocorrem durante colonoscopias diagnósticas são mais comuns no:**

- A. Íleo terminal.
- B. Ângulo hepático.
- C. Ângulo esplênico.
- D. Sigmóide.
- E. Reto.

**2 - A fasciite necrotizante de Fournier se associa com maior frequência a:**

- A. Diabetes mellitus.
- B. Aterosclerose.
- C. Alcoolismo.
- D. Malignidade hematológica.
- E. Insuficiência renal crônica.

**3 - A respeito da operação de Altemeier para cura da procidência de reto, escolha a melhor afirmativa:**

- A. Essa cirurgia não está indicada para pacientes idosos.
- B. Ela tem sua melhor indicação no prolapso com gangrena do reto.
- C. Apresenta os menores índices de recidiva entre todas as técnicas para procidência.
- D. A plicatura posterior do músculo elevador do ânus é desnecessária no procedimento.
- E. Na eventualidade de recidiva o melhor é fazer uma retossigmoidectomia abdominal com promontofixação do reto.

**4 - O atendimento per-operatório por via rápida ( fast-track surgery ) na cirurgia colorretal está relacionado a:**

- A. Analgesia por cateter peridural e hiper-hidratação per-operatória.
- B. Um preparo de colon rigoroso e analgesia com opióides venosos.
- C. Diminuição do jejum pré-operatório e alimentação precoce no pós.
- D. Não preparo de colon e jejum pré-operatório de 24 horas.
- E. Jejum pré-operatório prolongado e alimentação tardia no pós.