

1 - As fístulas aortocolônicas primárias:

- A. São bastantes comuns, embora subdiagnosticadas.
- B. Ocorrem após procedimentos cirúrgicos sobre a aorta.
- C. Apresentam-se habitualmente como um quadro de sepse.
- D. São geralmente causadas por um aneurisma de aorta.
- E. São melhor diagnosticadas por colonoscopia.

2 - O acesso videolaparoscópico na cirurgia da doença de Crohn:

- A. Pode ser utilizado, mas apenas no comprometimento do intestino delgado e da região ileocecal.
- B. Apresenta índices de recidiva superiores, quando comparado aos procedimentos abertos.
- C. É um procedimento de fácil execução mesmo para cirurgiões medianamente treinados em cirurgia videolaparoscópica.
- D. Tem como principal vantagem a manutenção da integridade da parede abdominal, em uma doença que pode requerer vários procedimentos cirúrgicos durante a vida.
- E. Deve ser usado apenas para derivações e procedimentos menores.

3 - A caracterização de “células em anel de sinete” na descrição do exame histopatológico de um carcinoma colorretal retirado significa:

- A. O mesmo que descrever como carcinoma mucinoso.
- B. Uma probabilidade maior de metástases hepáticas do que peritoneais e ovarianas .
- C. Uma probabilidade maior de metástases pulmonares do que peritoneais e ovarianas.
- D. Apenas um achado morfológico, sem quaisquer significados clínicos ou prognósticos.
- E. Um prognóstico pior em relação à sobrevida.

4 - Os tumores com a característica descrita acima (células em anel de sinete), quando comparados aos adenocarcinomas colorretais ordinários estão mais freqüentemente associados a:

- A. Aumento da instabilidade de microssatélites.
- B. Menor frequência de mutações no gen BRAF.
- C. Maior perda da heterozigose no gen 18 q.
- D. Maior quantidade de tumores localizados distalmente no cólon.
- E. Maior expressão de FASN (sintase de ácido graxo).