

1 - A formação de uma hérnia perineal após cirurgia de ressecção abdominoperineal do reto, está mais frequentemente associada a:

- A. Radioterapia prévia.
- B. Quimioterapia pós-operatória.
- C. Não fechar o peritônio pélvico.
- D. Não suturar o períneo.
- E. Exérese do cóccix.

2 - Em relação às manifestações extra-intestinais articulares na doença inflamatória intestinal, podemos afirmar que:

- A. São o segundo tipo mais comum de manifestação extra-intestinal, perdendo apenas para as cutâneas.
- B. São mais comuns em homens que em mulheres.
- C. Na doença de Crohn, pacientes com comprometimento colônico estão em risco maior do que aqueles com doença isolada do delgado.
- D. As artrites precisam ser confirmadas com a positividade do fator LE e anticorpo antinuclear.
- E. Essas artropatias estão sempre associadas à atividade da doença.

3 - A respeito da doença de Paget perianal podemos afirmar que:

- A. É mais comum em homens que em mulheres.
- B. Tem alta prevalência em homossexuais masculinos jovens.
- C. O sintoma clínico mais importante é prurido intratável.
- D. Não costuma se associar a malignidades.
- E. É uma neoplasia de crescimento local, não apresentando metástases.

4 - Ainda em relação à doença de Paget perianal é possível dizer, sobre o seu tratamento, que:

- A. A curetagem seguida de eletrocauterização está indicada quando não há invasão.
- B. O ácido tricloroacético a 90% costuma reduzir a carga viral de papilomas vírus e diminuir a lesão.
- C. O tratamento combinado de radio e quimioterapia constitui a abordagem ideal para os tumores invasivos.
- D. A ressecção local seguida de radioterapia é o tratamento de escolha para os casos com invasão.
- E. A ressecção abdominoperineal é o tratamento inicial de escolha para os pacientes com invasão.