

**1 - Na suspeita de comprometimento anorretal no trauma, a realização de retossigmoidoscopia pré-operatória:**

- A. Está contra-indicada devido ao risco de aumentar a lesão.
- B. Está contra-indicada devido à possibilidade de espalhar infecção pela insuflação de ar.
- C. Não fornece ajuda devido à presença de fezes.
- D. Permite a localização e avaliação da lesão na maioria das vezes.
- E. É uma boa via para a colocação de drenos pélvicos.

**2 - Os divertículos gigantes do cólon são encontrados mais frequentemente no:**

- A. Reto.
- B. Sigmóide.
- C. Descendente.
- D. Transverso.
- E. Ascendente.

**3 - Ainda sobre os divertículos gigantes do cólon podemos dizer que:**

- A. Não estão associados à diverticulose colônica.
- B. São mais comumente divertículos verdadeiros.
- C. Ocorrem geralmente na face mesentérica do cólon.
- D. São melhor tratados por diverticulectomia.
- E. O exame diagnóstico de eleição é o clister opaco.

**4 - O sinal da “Irmã Maria José” se refere a metástase para o:**

- A. Umbigo.
- B. Cerebelo.
- C. Trígono da bexiga.
- D. Baço.
- E. Músculo deltóide.