

RESPOSTAS DO TESTE DE AUTO-AVALIAÇÃO

1. Resposta certa é letra D

O termo carcinoma escamoso de canal anal engloba um diferente tipo de aspectos microscópicos que inclui o carcinoma cloacogênico, carcinoma basalóide e o carcinoma de células transicionais. A Doença de Paget é uma neoplasia intra-epitelial que compromete a pele da margem anal e não o canal anal.

Principles and Practice of Surgery for the Colon, Rectum and Anus Philip H. Gordon and Santhat Nivativong Third Edition - 2007

2. Resposta certa é letra A

Trata-se de um tumor T4 N2 M0.

Principles and Practice of Surgery for the Colon, Rectum and Anus Philip H. Gordon and Santhat Nivativong Third Edition - 2007

3. Resposta certa é letra C

A origem da artéria mesentérica superior pode ser identificada 3 a 4cm abaixo da terceira porção

duodenal ou cerca de 10cm acima do promontório. A artéria íleo-cólica é o ramo terminal da artéria mesentérica superior e está sempre presente. Não existe ramo ascendente da artéria mesentérica inferior.

Principles and Practice of Surgery for the Colon, Rectum and Anus Philip H. Gordon and Santhat Nivativong Third Edition - 2007

4. Resposta certa é letra C

Os carcinóides são tumores de crescimento lento de origem neuroectodérmica. São os tumores neuroendócrinos mais comuns no tubo digestivo. Têm origem nas células enterocromatofins localizadas nas glândulas de Lieberkung (Cels. de Kulchitsky). A quimio e radioterapia não se mostraram efetivas no tratamento das lesões sendo a cirurgia o tratamento primário de escolha. A dosagem do 5-HIAA na urina não tem valor diagnóstico nas lesões do reto. A incidência de lesões sincrônicas pode chegar a 55%.

Colon and Rectal Surgery, 5th Edition - 2005 Marvin L. Corman